

DUE เมษายน 2567

ยา	% (จำนวนใบ DUE ที่เก็บได้/จำนวนใบ DUE ทั้งหมดต่อเดือน*100) (จำนวนใบ DUE ที่เก็บได้/จำนวนใบ DUE ทั้งหมด)	
	OPD	IPD
Ceftazidime inj (1 g/vial)	-	ร้อยละ 66.67 (4/6)
Glargine (100 IU/mL)	-	-
Spiriva® (18 mcg/cap)	ร้อยละ 100 (1/1)	ร้อยละ 100 (1/1)
Novomix (100 IU/mL)	-	-
สรุป	ร้อยละ 75.00 (6/8)	

หมายเหตุ

- OPD: มีการสั่งใช้ Spiriva จำนวน 1 ราย และมีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะที่ Novomix, Ceftazidime inj. และ Glargine ไม่มีการสั่งใช้ยา
- IPD: มีการสั่งใช้ Ceftazidime inj. 6 ราย โดยมีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งหมด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีการสั่งใช้ Spiriva จำนวน 1 ราย โดยมีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งสิ้น 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะที่ Novomix และ Glargine ไม่มีการสั่งใช้ยา

ตารางสรุปเหตุผลในการสั่งใช้ยา (DUE) เดือนเมษายน 2567:

หน่วยงาน	ยา	เหตุผลในการใช้ยา
OPD	Spiriva	มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งสิ้น 1 ราย พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการในระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ยังคงแสดงอาการของโรคแม้จะได้รับการรักษาด้วย SERETIDE MDI (25/125) 2 puff bid และ Theophylline (200) 1x2 po pc ผลการประเมินพบว่า: มีความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา
IPD	Ceftazidime inj	มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งสิ้น 4 ราย จากผู้ป่วยที่ได้รับยาทั้งสิ้น 6 ราย โดยผู้ป่วย 3 รายถูกสั่งใช้เป็น Empirical therapy เนื่องจากมีอาการที่อาจสงสัยการติดเชื้อ <i>P. aeruginosa</i> หรือ <i>P. Psuedomononia</i> และผู้ป่วย 1 ราย ถูกสั่งใช้ในกรณี step up antibiotics เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น โดยแพทย์มีการปรับยาตามการทำงานของไตของผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ผลการประเมินพบว่า: มีความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาในแง่ของข้อบ่งใช้และขนาดยา